REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ZERO

CONCORSO PUBBLICO PER N. 7 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ORTOTTISTA

PROVA SCRITTA

QUESTIONARIO N. 1

1) **Test di Brükner (test del riflesso rosso) serve per:**
   Ⓐ solo per lo screening della cataratta congenita inserito nei LEA
   Ⓑ per evidenziare opacità dei mezzi diottrici e leucocorie
   Ⓒ per evidenziare opacità dei mezzi diottrici, leucocorie e strabismo
   Ⓓ per evidenziare opacità dei mezzi diottici, leucocorie, strabismo e difetti refrattivi superiori alle 2 diottrie

2) **Sono anomalie sensoriali:**
   Ⓐ la soppressione
   Ⓑ la fissazione eccentrica
   Ⓒ la corrispondenza retinica anomala
   Ⓓ tutte le precedenti

3) **Lo studio della pupillometria dinamica è indicata:**
   Ⓐ nello studio dell'accomodazione
   Ⓑ prima di eseguire chirurgia refrattiva
   Ⓒ in caso di paresi totale del III nervo cranico
   Ⓓ prima di eseguire PEV da FLASH

4) **Il test di Lang:**
   Ⓐ non è in grado di rilevare e identificare microstrabismi e anisometropie
   Ⓑ non è in grado di rilevare e identificare anisometropie compatibili con una stereopsi di almeno 200 sec. d'arco
   Ⓒ è sempre in grado di identificare i microstrabismi
   Ⓓ è sempre in grado di identificare i microstrabismi con CRA

5) **In tema di plasticità del sistema visivo:**
   Ⓐ il periodo critico della stereopsi è nettamente più breve di quello dell'acuità visiva
   Ⓑ la stereopsi è legata allo sviluppo della visione binoculare che si stabilizza tra gli 11 e 18 mesi
   Ⓒ il periodo plastico per l'acuità visiva comincia la parabola discendente verso i 48 – 54 mesi
   Ⓓ tutte le tre affermazioni sono vere

6) **DVD il termine dissociata è legato al fatto:**
   Ⓐ che questo movimento non segue la legge di Hering
   Ⓑ occludendo un occhio questo devierà verso l'alto, alla rimozione dell'occlusione esso ritorna in posizione primaria mentre non si apprezza nell'altro alcun movimento
   Ⓒ la deviazione verticale si apprezza in adduzione e non in abduzione
   Ⓓ A + B

7) **Test di adattamento prismatico ha come obiettivi:**
   Ⓐ valutare il rischio di diplopia post-operatoria
   Ⓑ valutare la possibilità di VB post-operatoria
   Ⓒ negli strabismi a piccolo angolo con CRA valutare la refrattarietà all'allineamento degli assi visivi
   Ⓓ tutte le precedenti

8) **EEI va in diagnosi differenziale con (segnare la risposta errata):**
   Ⓐ paralisi congenita mono o bilaterale del VI NC
   Ⓑ sindrome di Duane di 2° tipo
   Ⓒ esotropia accomodativa ad esordio precoce
   Ⓓ esotropia sensoriale e sindrome da blocco del niostagmo

9) **Test delle duzioni forzate:**
   Ⓐ è utile nella diagnosi differenziale tra paralisi e sindrome restrittiva
   Ⓑ utile anche prima di iniziare ogni intervento chirurgico in sala operatoria per evidenziare eventuali contratture
   Ⓒ utile in caso di click syndrome per risolvere l'ipotropia in adduzione
   Ⓓ tutte le precedenti

10) **La frattura traumatica del pavimento orbitario può comportare:**
   Ⓐ esoftalmo
   Ⓑ visione singola in tutte le posizioni diagnostiche di sguardo
   Ⓒ enoftalmo più diplopia nello sguardo in basso
   Ⓓ nessuna delle precedenti

11) In riferimento alla sindrome di Moebius quale di queste definizione è errata:

Ⓐ è caratterizzata dall'impossibilità di abdurre gli occhi oltre la linea mediana
Ⓑ è caratterizzata da paralisi bilaterale centrale del VII NC
Ⓒ è presente exotropia
Ⓓ nessuna delle precedenti

12) Tra le forme acquisite della sindrome di Brown vanno ricordate (segnare la risposta errata):

Ⓐ le trocleiti infiammatorie
Ⓑ danni traumatici della troclea
Ⓒ forme iatrogene post – chirurgiche da duplicatura del grande obliquo
Ⓓ fratture blow - out

13) Timing chirurgico nell'esotropia acuta:

Ⓐ entro 6 mesi sotto i 6 anni, entro 1 anno dopo i 6 anni
Ⓑ va operata il prima possibile
Ⓒ in attesa di intervento si ripristina la visione binoculare con prismi
Ⓓ B + C

14) Migliore risultato possibile post chirurgia nelle EEI :

Ⓐ un angolo di strabismo post chirurgico entro le 10DP orizzontali e fino a 4DP verticali
Ⓑ ortotropia
Ⓒ ortoforia
Ⓓ microstrabismo con CRN

15) Nell'esotropia del grande miope quando la RMN evidenzia lo scivolamento muscolare l'intervento attualmente più utilizzato è:

Ⓐ recessione RM e resezione RL
Ⓑ unione del ventre muscolare tra RL e RS associata o meno alla recessione ipsilaterale del RM
Ⓒ intervento di supplenza tipo Knapp sul RL
Ⓓ duplicatura del RS e recessione del RM

16) Una chirurgia di rinforzo dei muscoli (segnare la risposta errata) :

Ⓐ nei retti sposta l'occhio verso l'apice dell'orbita
Ⓑ nei muscoli obliqui spinge l'occhio verso l'esterno dell'orbita
Ⓒ una chirurgia di importante indebolimento dei muscoli obliqui favorisce l'esoftalmo
Ⓓ una chirurgia importante di rinforzo dei retti può avere come effetto un enoftalmo

17) Quale tra le seguenti è una terapia riabilitativa ortottica?

Ⓐ correzione prismatica
Ⓑ perimetria computerizzata
Ⓒ pachimetria
Ⓓ perimetria manuale di Goldmann

18) I settori binasali sono utili nel trattamento:

Ⓐ dell'esotropia congenita di tipo crociato
Ⓑ nell'exotropia
Ⓒ nell'ambliopia bilaterale
Ⓓ nella limitazione dell'adduzione

19) Nel trattamento dell'ambliopia la penalizzazione con + 3,00 sfera dell'occhio sano è utile:

Ⓐ solo per vicino
Ⓑ solo per lontano
Ⓒ per vicino e lontano
Ⓓ non si utilizza

20) Con l'acronimo ECM si intende definire:

Ⓐ essenziale competenza medica
Ⓑ educazione e cultura medica
Ⓒ elementi di cultura medica
Ⓓ educazione continua in medicina