

REGIONE DEL VENETO



AZIENDA
Z E R O

**Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 40 posti di Collaboratore
Professionale Sanitario - OSTETRICA/O - cat. D**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 19 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 e s.m.i., si riportano i criteri di valutazione della Commissione Esaminatrice e le tracce della prova SCRITTA.

Le tracce sorteggiate sono la n.1 e la n. 2.
Sono rimaste pertanto non estratte le tracce n. 3 e n. 4.

I criteri di valutazione sono i seguenti:

- attribuzione di un punto (+1) per ogni risposta corretta;
- attribuzione di zero punti (0) per ogni risposta errata, omessa o multipla.

TEST N.1

- 1) Quali delle seguenti non è una complicanza alla episiotomia?
 - a) Estensione chirurgica od involontaria dell'incisione
 - b) Fistole vaginali
 - c) Asimmetria della sutura
 - d) Aumento dello spazio in caso di parto operativo
 - e) Dispareunia

- 2) L'UNICEF e l'OMS hanno redatto un decalogo di *Passi* a sostegno dell'allattamento al seno, che ogni Struttura Sanitaria deve adottare per poter essere riconosciuta "*Ospedale amico del bambino*", quale fra i seguenti rappresenta il nono passo?
 - a) Non somministrare ai neonati alimenti o liquidi diversi dal latte materno, tranne che su precisa prescrizione medica
 - b) Aiutare le madri perché comincino ad allattare al seno già mezz'ora dopo il parto
 - c) Mostrare alle madri come allattare e come mantenere la secrezione latteica anche nel caso in cui vengano separate dai neonati
 - d) Informare tutte le donne in gravidanza dei vantaggi e dei metodi di realizzazione dell'allattamento al seno
 - e) Non dare tettarelle artificiali o succhiotti ai neonati durante il periodo dell'allattamento

- 3) Le "t " che rappresentano le cause dell'emorragia post parto indicano:
 - a) Tono trauma trombina tessuto
 - b) Tono trauma trombina trattamento
 - c) Tono trauma tessuto
 - d) Tono trauma trattamento
 - e) Nessuna delle precedenti

- 4) Quali tra seguenti segni/ sintomi non sono caratteristici della Tireotossicosi Gravidica?
 - a) Bradicardia, ipotermia
 - b) Tachicardia, ipertermia
 - c) Nausea, vomito, diarrea
 - d) Irrequietezza, nervosismo
 - e) Aumento valori ematici di triiodotironina e tetraiodotironina

- 5) Cos'è il fumo di terza mano?
 - a) E' quello che viene inalato involontariamente dalle persone che si trovano a contatto con uno o più fumatori "attivi"
 - b) E' quello proveniente dal fumo della sigaretta elettronica
 - c) E' rappresentato dai residui tossici rilasciati nell'ambiente da sigarette spente che si depositano su vestiti, tappezzeria, oggetti, mobili
 - d) E' quello di chi fuma dentro un'automobile
 - e) Tutte le precedenti

- 6) Nella presentazione di faccia qual è il diametro fetale che si impegna nella pelvi?
 - a) Sottomento bregmatico
 - b) Sottoccipito bregmatico
 - c) Occipito frontale
 - d) Mento occipitale

e) Mento bregmatico

7) Il Partogramma è uno:

- a) Strumento grafico dove la dilatazione cervicale viene espressa in centimetri
- b) Strumento grafico dove la dilatazione cervicale viene espressa in centimetri e viene correlata col tempo espresso in ore
- c) Strumento grafico dove la dilatazione cervicale viene espressa in centimetri viene correlata col tempo espresso in ore, compilato esclusivamente dal medico
- d) Strumento grafico dove vengono registrati i parametri materni
- e) Nessuna delle precedenti

8) Un elevato BMI materno pre concezionale :

- a) Aumenta il rischio di difetti del tubo neurale
- b) Aumenta il rischio di diabete gestazionale
- c) Aumenta il rischio di morte fetale intrauterina
- d) Tutte le precedenti
- e) Nessuna delle precedenti

9) Con l'acronimo SIDS si intende:

- a) Sudden infant death syndrome
- b) Sudden and unexpected infant death
- c) Sudden unexpected early neonatal death
- d) Sudden unexpected postnatal collapse
- e) Sudden intrauterine death syndrome

10) Il profilo professionale della ostetrica/o è definito nel:

- a) D.M. 14.10.1994, n.740
- b) D.lg 14.09.1994, n.470
- c) D.M. 14.09.1994 ,n. 740
- d) D.lg 14.10.1994, n.740
- e) Nessuna delle precedenti

11) Quando deve essere somministrata, ad una donna Rh Negativa, l'immunoprofilassi con IgG anti- D?

- a) Immediatamente dopo il parto
- b) Se il titolo anticorpale è elevato
- c) Dopo la translucenza nucale
- d) Entro 72h dal parto
- e) Se il partner è Rh Positivo

12) La perdita ematica da placenta previa si manifesta con :

- a) Utero contratto, dolore intenso
- b) Sanguinamento massivo rosso vivo
- c) Coagulazione intravasale disseminata
- d) Dolore spesso assente, perdita ematica graduale
- e) Borsa amniotica tesa

13) Quale farmaco viene utilizzato come anticonvulsivante per prevenire la crisi eclamptica nella gravida?

- a) Calcio gluconato
- b) Labetalolo
- c) Benzodiazepine

- d) Verapamil
- e) Magnesio solfato

14) Quale delle seguenti è una condizione sfavorevole all'applicazione di una ventosa ostetrica?

- a) Vescica materna vuota
- b) Dilatazione cervicale completa
- c) Possibilità di eseguire un taglio cesareo emergente in caso di fallimento dell'applicazione della ventosa ostetrica
- d) Inesperienza dell'operatore
- e) Presenza del Neonatologo o Pediatria per garantire eventuali manovre rianimatorie

15) In che cosa consiste la manovra di Rubin II?

- a) Consiste nel favorire la rotazione delle spalle del feto in posizione obliqua inserendo le dita di una mano dietro la spalla più accessibile e spingendo la spalla verso il torace fetale
- b) Riposizionamento della testa fetale in utero e successivo parto cesareo
- c) Consiste in una pressione soprapubica applicata in combinazione con la manovra di Mc Roberts
- d) Consiste nel rimuovere il braccio posteriore
- e) Nessuna delle precedenti

16) Quando una donna non può dichiarare la sua volontà di "*non essere nominata*" al momento del parto?

- a) La nascita avviene a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita
- b) Età materna inferiore a 16 anni
- c) Se la donna presenta altri figli riconosciuti
- d) Se la donna partorisce nel matrimonio
- e) Se il personale sanitario è obietto

17) Il taglio cesareo per prevenire l'infezione da HPV nel neonato è raccomandato nei casi di :

- a) Condilomatosi materna florida anorettale
- b) Lesioni cervicali di basso grado
- c) Lesioni cervicali e vulvari di alto grado
- d) Mancata rimozione della condilomatosi durante la gravidanza
- e) Nessuna delle precedenti

18) La dispareunia è:

- a) Dolore durante il rapporto sessuale
- b) Assenza totale o parziale di orgasmo
- c) Secchezza vaginale
- d) Dolore pelvico cronico
- e) Facilità alla distrazione mentale durante il rapporto

19) Quale affermazione è vera, il latte materno fresco può essere conservato:

- a) A 25°C per circa 4 ore
- b) A 15-25°C 16 ore
- c) A meno di 15°C per 48 ore
- d) Refrigerato (2-4°C) fino a 15 giorni
- e) A 37°C per 24 ore

- 20) Secondo le raccomandazioni sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 in gravidanza e allattamento, quale affermazione non è veritiera?
- a) Le donne che allattano, possono vaccinarsi, senza alcuna necessità di interrompere l'allattamento
 - b) La donna che allatta deve essere informata che la vaccinazione non espone il lattante a rischi e gli permette di assumere, tramite il latte, anticorpi contro SARS-CoV-2
 - c) Il neonato allattato da madre vaccinata deve posticipare il suo calendario vaccinale per la profilassi delle altre malattie infettive
 - d) Alla donna che allatta viene raccomandato l'uso della mascherina negli ambienti chiusi e in prossimità di altre persone non conviventi/non vaccinate
 - e) I sanitari devono raccomandare la vaccinazione dei conviventi per limitare ulteriormente il rischio di contagio delle donne in gravidanza e durante l'allattamento
- 21) Cosa si intende per Incident Reporting ?
- a) E' una modalità di raccolta di segnalazioni in modo strutturato di eventi avversi o *near miss*, allo scopo di fornire una base di analisi, predisposizioni di strategie e azioni di correzione e miglioramento per prevenire l'accadimento in futuro
 - b) E' una modalità di raccolta e di segnalazioni di eventi avversi o *near miss*, allo scopo di servire una base di analisi, predisposizioni di strategie e azioni di correzione e miglioramento allo scopo di identificare e sanzionare chi ha segnalato
 - c) E' una modalità di raccolta e di segnalazioni di eventi avversi o *near miss*, allo scopo di fornire alla Direzione Aziendale una base di analisi che permetta di evidenziare eventuali criticità dei differenti contesti clinici da discutere negli obiettivi di budget
 - d) E' una modalità di raccolta e di segnalazioni di eventi avversi o *near miss*, allo scopo di servire una base di analisi, predisposizioni di strategie e azioni di correzione e miglioramento senza il coinvolgimento dei professionisti interessati nell'evento
 - e) Nessuna delle precedenti
- 22) La Costituzione della Repubblica Italiana riconosce e garantisce la Salute come:
- a) Diritto dei cittadini Italiani
 - b) Diritto dei cittadini Europei
 - c) Diritto delle Comunità Locali
 - d) Diritto delle persone
 - e) Tutte le precedenti
- 23) Le decelerazioni precoci:
- a) Mantengono tra loro una morfologia costante
 - b) Hanno un esordio tardivo rispetto l'inizio della contrazione
 - c) Sono tipiche della prima fase del travaglio
 - d) Hanno significato sfavorevole in quanto associate ad ipossia
 - e) Possono essere atipiche
- 24) La misurazione dello Bishop Score prevede la valutazione della maturazione della cervice uterina attraverso:
- a) Dilatazione, appianamento, livello della parte presentata, consistenza e posizione della cervice
 - b) Dilatazione, appianamento, consistenza e posizione della cervice
 - c) Dilatazione, appianamento, posizione della parte presentata, consistenza della cervice
 - d) Dilatazione, livello della parte presentata, consistenza e posizione della cervice
 - e) Dilatazione, appianamento, livello della parte presentata, consistenza e posizione della cervice, situazione del feto

25) Si definisce tasso di mortalità neonatale:

- a) Il rapporto tra il numero dei neonati morti entro 28 giorni dalla nascita in un dato intervallo di tempo e i nati vivi nello stesso intervallo di tempo, moltiplicato per 1000
- b) Il rapporto tra il numero dei neonati morti entro 7 giorni dalla nascita in un dato intervallo di tempo e i nati vivi per 1000 nello stesso intervallo di tempo
- c) Il rapporto tra il numero dei nati morti in un dato intervallo di tempo e il totale dei nati (nati morti e nati vivi) nello stesso intervallo di tempo, moltiplicato per mille
- d) il rapporto tra il numero dei nati morti sommato al numero dei neonati morti entro i primi 7 giorni di vita in un dato intervallo di tempo e il totale dei nati (nati morti e nati vivi) nello stesso intervallo di tempo, moltiplicato per mille
- e) Il rapporto tra il numero di near miss e il totale dei parti (nati vivi e nati morti) in uno stesso intervallo di tempo

26) Quale tra le seguenti non rappresenta un fattore di rischio per la distocia di spalla?

- a) Macrosomia
- b) Diabete mellito materno
- c) Parto operativo
- d) Parità ed epoca gestazionale
- e) Utilizzo infusione di Ossitocina

27) Quali sono i criteri diagnostici che vanno a determinare il test qSofa (Quick Sequential Organ Failure Assessment) utile a distinguere la sepsi da infezioni non complicate?

- a) Stato mentale, pressione arteriosa, atti respiratori
- b) Stato mentale, frequenza cardiaca, atti respiratori
- c) Stato mentale, temperatura frequenza cardiaca
- d) Stato mentale pressione arteriosa diuresi oraria
- e) Stato mentale, pressione arteriosa, saturazione ossigeno

28) L'utilizzo dell'acqua in travaglio:

- a) Aumenta la pressione arteriosa
- b) Diminuisce l'impiego dell'analgesia epidurale-spinale
- c) Aumenta il rischio di lacerazioni vagino perineali
- d) Diminuisce la libertà di movimento della donna
- e) Aumenta il rischio di emorragia post parto

29) L'aspirazione delle prime vie aeree del neonato alla nascita:

- a) Deve sempre essere effettuata
- b) Non provoca riflessi vagali da stimolazione della parete posteriore della faringe
- c) Vanno aspirate prima le narici e poi la bocca
- d) Il neonato deve essere posizionato col collo in leggera estensione
- e) La pressione di aspirazione può essere superiore a 120mmhg

30) Il dosaggio del marker sierico CA 125 per quale tumore è più appropriato?

- a) Tumore della granulosa-teca dell'ovaio
- b) Cistoadenocarcinoma sieroso
- c) Tumore del seno endodermico
- d) Tumore delle cellule di Sertoli- Leydig
- e) Coriocarcinoma

TEST N.2

- 1) Cosa si intende per situazione fetale?
 - a) La prima grossa parte fetale che si mette in relazione con lo stretto superiore del bacino
 - b) Rapporto tra il maggior asse del corpo fetale ed il maggior asse della cavità uterina
 - c) Rapporto che prende la parte presentata con determinati punti della pelvi materna
 - d) Relazione tra il repere di presentazione della parte presentata e lo stretto superiore
 - e) Distanza in centimetri tra la parte presentata e le spine ischiatiche

- 2) Quanto misura la coniugata ostetrica?
 - a) Circa 9-10 cm
 - b) Circa 13 cm
 - c) Circa 10,6 cm
 - d) Circa 8 cm
 - e) Circa 14 cm

- 3) Con la terza manovra di Leopold si valuta:
 - a) Il livello raggiunto dal fondo dell'utero
 - b) Quale parte del feto si trova all'ingresso pelvico
 - c) La situazione del feto
 - d) La posizione del dorso fetale e le sue piccole parti
 - e) La discesa della parte presentata nello scavo pelvico

- 4) Nella presentazione di bregma qual è il diametro fetale che si impegna nella pelvi?
 - a) Sottomento bregmatico
 - b) Sottoccipito bregmatico
 - c) Occipito frontale
 - d) Mento occipitale
 - e) Mento bregmatico

- 5) Cosa si intende per Incident Reporting ?
 - a) E' una modalità di raccolta di segnalazioni in modo strutturato di eventi avversi o *near miss*, allo scopo di fornire una base di analisi, predisposizioni di strategie e azioni di correzione e miglioramento per prevenire l'accadimento in futuro
 - b) E' una modalità di raccolta e di segnalazioni di eventi avversi o *near miss*, allo scopo di servire una base di analisi, predisposizioni di strategie e azioni di correzione e miglioramento allo scopo di identificare e sanzionare chi ha segnalato
 - c) E' una modalità di raccolta e di segnalazioni di eventi avversi o *near miss*, allo scopo di fornire alla Direzione Aziendale una base di analisi che permetta di evidenziare eventuali criticità dei differenti contesti clinici da discutere negli obiettivi di budget
 - d) E' una modalità di raccolta e di segnalazioni di eventi avversi o *near miss*, allo scopo di servire una base di analisi, predisposizioni di strategie e azioni di correzione e miglioramento senza il coinvolgimento dei professionisti interessati nell'evento
 - e) Nessuna delle precedenti

- 6) Quale fra le seguenti manifestazioni cliniche non è associata alla Chetoacidosis Diabetica?
 - a) Secchezza delle mucose
 - b) Alito acetonemico
 - c) Astenia
 - d) Perdita di peso
 - e) Oliguria

- 7) Quale di queste risposte è vera? L'amnioressi:
- a) L'ostetrica può eseguirla sempre in autonomia
 - b) E' una procedura di accelerazione del travaglio di parto
 - c) E' una procedura che non presenta rischi materno-fetali
 - d) Viene sempre praticata sotto guida ecografica
 - e) Nessuna delle precedenti
- 8) Durante il travaglio la posizione a carponi della gravida viene consigliata :
- a) Durante il primo e secondo stadio
 - b) Se il feto si trova in occipite posteriore
 - c) Sensazione di premito prima della dilatazione cervicale completa
 - d) Presenza di edema del bordo anteriore del collo uterino
 - e) Tutte le precedenti
- 9) Quali tra le seguenti lesioni vengono definite lacerazioni di secondo grado?
- a) La lacerazione che coinvolge la forchetta, la cute perineale e la mucosa vaginale
 - b) La lacerazione che coinvolge anche lo sfintere dell'ano
 - c) La lacerazione che coinvolge la fascia e i muscoli perineali
 - d) La lacerazione che coinvolge anche la mucosa del retto
 - e) La lacerazione che coinvolge solo la mucosa vaginale
- 10) I tubercoli di Montgomery sono:
- a) Ghiandole sebacee della areola mammaria
 - b) Ghiandole sudoripare
 - c) Ghiandole mammarie che secernono colostro
 - d) Piccoli brufoli che appaiono in gravidanza
 - e) Nessuna delle precedenti
- 11) Il profilo professionale della ostetrica/o è definito nel:
- a) D.M. 14.10.1994, n.740
 - b) D.lg 14.09.1994, n.470
 - c) D.M. 14.09.1994 ,n. 740
 - d) D.lg 14.10.1994, n.740
 - e) Nessuna delle precedenti
- 12) Qual è uno dei i fattori di rischio per la SUPC (Sudden Unexpected Postanal Collapse)?
- a) Primiparità
 - b) Età materna
 - c) Parto vaginale complicato
 - d) Co-bedding
 - e) Tutte le precedenti
- 13) Il Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno, approvato dall'Assemblea Mondiale della Sanità (AMS):
- a) E' una legge basata sul giudizio collettivo espresso da tutti i membri dell'AMS
 - b) Promuove la pubblicità o altra forma di promozione dei sostituti del latte materno
 - c) Pone l'obiettivo di costringere le donne ad allattare al seno

- d) Nega la produzione dei sostituti del latte materno
- e) Protegge anche i bambini allattati artificialmente, assicurando che la scelta dei prodotti sia imparziale e scientificamente valida

14) Nella normale pratica clinica l'esecuzione dell'ecografia nel primo trimestre di gravidanza ha lo scopo di:

- a) Localizzare la placenta
- b) Determinare la quantità del liquido amniotico
- c) Valutare l'anatomia della colonna vertebrale fetale
- d) Valutare le regioni annessiali e la morfologia uterina
- e) Visualizzare le ossa lunghe fetali

15) In cosa consiste la manovra di Jacquemier?

- a) Consiste in una pressione sovrapubica applicata in combinazione con la manovra di Mc Roberts
- b) Consiste nel favorire la rotazione delle spalle del feto in posizione obliqua
- c) Consiste nel rimuovere il braccio posteriore, inserendo le mani nella cavità sacrale per identificare la spalla posteriore e percorrere il braccio fino al polso. Quindi ruotare il braccio sul petto fetale flettendo il gomito ad estrarlo dalla rima vulvare
- d) Consiste nel rimuovere il braccio anteriore, inserendo le mani nella cavità sacrale per identificare la spalla posteriore e percorrere il braccio fino al polso. Quindi ruotare il braccio sul petto fetale flettendo il gomito ad estrarlo dalla rima vulvare
- e) Consiste nel riposizionamento della testa fetale in utero e successivo cesareo emergente

16) Quali sono i segni dello shock emorragico severo?

- a) Ipotensione severa (< 50 mmHg)
- b) Pallore, cute fredda
- c) Fame d'aria
- d) Anuria
- e) Tutte le precedenti

17) Il farmaco di prima scelta nel trattamento dell'emorragia post parto è:

- a) Ossitocina
- b) Misoprostolo
- c) Acido tranexamico
- d) Metilergometrina
- e) Prostaglandine

18) L'identificazione del paziente, prima di qualsiasi prestazione sanitaria, va sempre effettuata:

- a) Con braccialetto identificativo paziente e controllando la documentazione clinica
- b) Controllando la documentazione sanitaria
- c) Controllando la documentazione sanitaria e chiedendo l'identità direttamente al paziente
- d) Controllando il numero del letto assegnato al paziente
- e) Nessuna delle precedenti

19) Qual è il farmaco antagonista del Solfato di Magnesio?

- a) Insulina endovenosa
- b) Calcio Gluconato
- c) Benzodiazepine
- d) Ringer Lattato
- e) Nifedipina

20) Il programma nazionale "Genitoripiù":

- a) Promuove otto azioni per la salute degli adolescenti
- b) Non promuove la formazione degli operatori sanitari
- c) Promuove otto azioni per la salute nei primi 1000 giorni di vita, tra cui l'astensione all'alcol in gravidanza
- d) Promuove sei azioni per la salute nei primi 1000 giorni di vita, tra cui l'astensione all'alcol in gravidanza
- e) Suggerisce di non individuare le risorse sul territorio

21) Il segno di Spalding è rappresentato da:

- a) Turgidità mammaria con comparsa di montata lattea
- b) Presenza di bolle gassose attorno al cuore fetale
- c) Accavallamento delle ossa craniche fetali
- d) Assenza di variazione delle posizioni fetali
- e) Iperflessione del capo fetale

22) Il cordone ombelicale contiene:

- a) Due vene ed una arteria
- b) Tre vene
- c) Due arterie ed una vena
- d) Due arterie
- e) Vasi capillari

23) I segni caratteristici della HELLP syndrome sono :

- a) Emolisi, aumento dei valori degli enzimi epatici, diminuzione delle piastrine
- b) Emolisi, aumento dei valori degli enzimi epatici e delle piastrine
- c) Diminuzione della bilirubina e del lattato deidrogenasi
- d) Aumento del valore dell'emoglobina e degli enzimi epatici ,diminuzione delle piastrine
- e) Nessuno dei precedenti

24) La presenza di vasi previ fetali comporta:

- a) Aumentato rischio di distocia dinamica
- b) Aumentato rischio di morte endouterina del feto a seguito della rottura delle membrane amniocoriali
- c) Aumentato rischio di rottura spontanea d'utero
- d) Necessità di indurre farmacologicamente il travaglio a 38 settimane di gravidanza
- e) Grave anemizzazione materna

25) Quale è il segno di un attacco inadeguato di un neonato allattato al seno?

- a) La bocca è ben aperta
- b) Il labbro inferiore è rivolto all'esterno
- c) Il mento tocca il seno
- d) Si vede più areola sotto che sopra la bocca del neonato
- e) La madre non avverte dolore durante la poppata

26) Si definisce placenta increta quando:

- a) I villi coriali penetrano nella cervice uterina
- b) I villi coriali sono a diretto contatto del miometrio
- c) I villi coriali penetrano nel miometrio
- d) I villi coriali raggiungono la sierosa
- e) I villi coriali sono a diretto contatto con la decidua

27) Quale fra le seguenti non è causa di amenorrea?

- a) Diabete mellito

- b) Sindrome di Turner
- c) Sindrome dell'ovaio policistico
- d) Iperprolattinemia
- e) Iperplasia surrenalica congenita

28) Una donna non può dichiarare la sua volontà di "*non essere nominata*" al momento del parto, quando:

- a) La nascita avviene a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita
- b) Età materna inferiore a 16 anni
- c) Se la donna presenta altri figli riconosciuti
- d) Se la donna partorisce nel matrimonio
- e) Se il personale sanitario è obietto

29) La placenta previa non è:

- a) Laterale
- b) Completa
- c) Parziale
- d) Fundica
- e) Marginale

30) Nella classificazione secondo Robson, in quante classi sono divise le pazienti?

- a) 12
- b) 8
- c) 10
- d) 6
- e) 4

TEST N. 3

- 1) L'UNICEF e l'OMS hanno redatto un decalogo di *Passi* a sostegno dell'allattamento al seno, che ogni Struttura Sanitaria deve adottare per poter essere riconosciuta "*Ospedale amico del bambino*", quale fra i seguenti rappresenta il terzo passo?
 - a) Non somministrare ai neonati alimenti o liquidi diversi dal latte materno, tranne che su precisa prescrizione medica
 - b) Aiutare le madri perché comincino ad allattare al seno già mezz'ora dopo il parto
 - c) Mostrare alle madri come allattare e come mantenere la secrezione latteica anche nel caso in cui vengano separate dai neonati
 - d) Informare tutte le donne in gravidanza dei vantaggi e della gestione dell'allattamento al seno
 - e) Non dare tettarelle artificiali o succhiotti ai neonati durante il periodo dell'allattamento

- 2) Le "t " che rappresentano le cause dell'emorragia post-parto indicano:
 - a) Tono trauma trombina tessuto
 - b) Tono trauma trombina trattamento
 - c) Tono trauma tessuto
 - d) Tono trauma trattamento
 - e) Nessuna delle precedenti

- 3) La misurazione dello Bishop Score prevede la valutazione della maturazione della cervice uterina attraverso:
 - a) Dilatazione, appianamento, livello della parte presentata, consistenza e posizione della cervice
 - b) Dilatazione, appianamento, consistenza e posizione della cervice
 - c) Dilatazione, appianamento, posizione della parte presentata, consistenza della cervice
 - d) Dilatazione, livello della parte presentata, consistenza e posizione della cervice
 - e) Dilatazione, appianamento, livello della parte presentata, consistenza e posizione della cervice, situazione del feto

- 4) Cosa si intende per Incident Reporting ?
 - a) E' una modalità di raccolta di segnalazioni in modo strutturato di eventi avversi o *near miss*, allo scopo di fornire una base di analisi, predisposizioni di strategie e azioni di correzione e miglioramento per prevenire l'accadimento in futuro
 - b) E' una modalità di raccolta e di segnalazioni di eventi avversi o *near miss*, allo scopo di servire una base di analisi, predisposizioni di strategie e azioni di correzione e miglioramento allo scopo di identificare e sanzionare chi ha segnalato
 - c) E' una modalità di raccolta e di segnalazioni di eventi avversi o *near miss*, allo scopo di fornire alla Direzione Aziendale una base di analisi che permetta di evidenziare eventuali criticità dei differenti contesti clinici da discutere negli obiettivi di budget
 - d) E' una modalità di raccolta e di segnalazioni di eventi avversi o *near miss*, allo scopo di servire una base di analisi, predisposizioni di strategie e azioni di correzione e miglioramento senza il coinvolgimento dei professionisti interessati all'evento
 - e) Nessuna delle precedenti

- 5) L'indice di presentazione nella presentazione di bregma è:
 - a) Piccola fontanella
 - b) Grande fontanella
 - c) Acromion
 - d) Mento radice del naso
 - e) Fronte

- 6) Il secondo stadio del travaglio:

- a) Inizia quando la dilatazione è completa e termina con l'espulsione del feto
- b) Comprende l'espulsione della placenta con membrane e funicolo ed inizia dopo l'espulsione del feto
- c) Corrisponde al periodo di latenza
- d) E' caratterizzato dai fenomeni dinamici del parto
- e) Ha una durata massima di due ore

7) Quale è la causa principale di morte diretta materna entro 42 giorni dal parto?

- a) Tromboembolia
- b) Disturbi ipertensivi della gravidanza
- c) Sepsi puerperale
- d) Emorragia ostetrica
- e) Embolia da liquido amniotico

8) Quale fattore non aumenta il rischio di infezioni in puerperio?

- a) Rottura prolungata delle membrane
- b) Parto operativo
- c) Età materna
- d) Ritenzione di materiale placentare
- e) Numero visite vaginali in travaglio superiori a 5

9) Quali sono i segni di una suzione inadeguata di un neonato allattato al seno?

- a) Suzione lenta e profonda, a volte con breve pausa
- b) Si vede e si sente la deglutizione del neonato
- c) Le guance del neonato sono piene arrotondate
- d) Il neonato produce rumori di schiocco
- e) Il neonato termina la poppata e lascia da solo il seno

10) Quali sono i segni dello shock emorragico severo?

- a) Ipotensione severa (< 50 mmHg)
- b) Pallore, cute fredda
- c) Fame d'aria
- d) Anuria
- e) Tutte le precedenti

11) Quale sintomo non si manifesta routinariamente in una paziente pre-eclamptica?

- a) Edema arti inferiori
- b) Epigastralgia
- c) Cefalea
- d) Disturbi visivi
- e) Eritema diffuso

12) Quali tra seguenti segni/ sintomi non sono caratteristici della Tireotossicosi Gravidica?

- a) Bradicardia, ipotermia
- b) Tachicardia, ipertermia
- c) Nausea, vomito, diarrea
- d) Irrequietezza, nervosismo
- e) Aumento valori ematici di triiodotironina e tetraiodotironina

- 13) L'infezione neonatale da Streptococco di gruppo B può essere prevenuta attraverso:
- a) L'esecuzione di tampone vaginale e rettale materno alla 28 settimana di gravidanza
 - b) L'esecuzione di tampone vaginale e rettale materno da 1 a 5 settimane prima del parto
 - c) La somministrazione a tutte le partorienti terapia profilattica antibiotica con Penicillina
 - d) La somministrazione a tutti i neonati terapia profilattica antibiotica con Penicillina
 - e) Non sono disponibili test per diagnosticare la contaminazione batterica
- 14) Nausea e vomito sono comuni in gravidanza a causa di:
- a) Aumentati livelli di Prolattina
 - b) Ridotti livelli di progesterone
 - c) Aumentati livelli di hCG ed estrogeni
 - d) Ridotti livelli di estrogeni
 - e) Nessuna delle precedenti
- 15) L'IVG entro 90 giorni può essere richiesta:
- a) Dal medico curante della donna
 - b) Dal partner
 - c) Dalla donna stessa
 - d) Dal Consultorio Familiare
 - e) Dalla madre della donna gravida
- 16) Quale dei seguenti parametri non è compreso nella valutazione dell'Indice di Apgar?
- a) Colore della pelle
 - b) Frequenza cardiaca
 - c) Riflessi agli stimoli
 - d) Tono muscolare
 - e) Temperatura corporea
- 17) Quale tra le seguenti rappresenta il trattamento elettivo della presentazione di spalla?
- a) Manovra di Kristeller
 - b) Taglio cesareo
 - c) La manovra di Mc Roberts
 - d) Versione per manovre interne
 - e) Parto vaginale
- 18) L'immunoprofilassi con IgG anti -D ad una donna Rh negativa viene somministrata:
- a) Entro 72 ore dal parto
 - b) Quando si eseguono procedure ostetriche invasive
 - c) In caso di aborto spontaneo
 - d) In presenza di emorragia ante parto
 - e) Tutte le precedenti
- 19) Secondo le raccomandazioni sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 in gravidanza e allattamento, quale affermazione non è vera?
- a) Le donne che allattano, possono vaccinarsi, senza alcuna necessità di interrompere l'allattamento
 - b) La donna che allatta deve essere informata che la vaccinazione non espone il lattante a rischi e gli permette di assumere, tramite il latte, anticorpi contro SARS-CoV-2
 - c) Il neonato allattato da madre vaccinata deve posticipare il suo calendario vaccinale per la profilassi delle altre malattie infettive

- d) Alla donna che allatta viene raccomandato l'uso della mascherina negli ambienti chiusi e in prossimità di altre persone non conviventi/non vaccinate
- e) I sanitari devono raccomandare la vaccinazione dei conviventi per limitare ulteriormente il rischio di contagio delle donne in gravidanza e durante l'allattamento

20) La posizione supina della gravida durante il travaglio:

- a) Favorisce la rotazione dell'occipite posteriore in occipito anteriore
- b) Favorisce un facile accesso per l'esplorazione vaginale
- c) Da prediligere durante la fase latente del travaglio
- d) Causa contrazioni meno dolorose, ma più efficaci rispetto alla posizione verticale
- e) Favorisce la spinta materna

21) Quali sono i principali segni di allerta correlati all'ipermagnesemia?

- a) Tachipnea, tachicardia, aumento riflessi rotulei
- b) Sudorazione profusa, tachipnea
- c) Poliuria, bradicardia, diminuzione riflessi rotulei
- d) Diminuzione riflessi rotulei, oliguria, diminuzione atti respiratori
- e) Arresto cardiaco e respiratorio

22) Quale tra queste affermazioni relative all'infezione materna da Toxoplasmosi è falsa?

- a) Si può evitare utilizzando adeguate misure igienico sanitarie
- b) La gravità dei danni neonatali è tanto più elevata quanto più precoce è l'infezione materna
- c) Il trattamento farmacologico è la Penicillina G
- d) I danni fetali- neonatali coinvolgono soprattutto il SNC
- e) L'infezione si trasmette per via transplacentare

23) I segni di certezza della gravidanza sono:

- a) Positività al test endocrino di gravidanza
- b) Modificazione del volume e consistenza dell'utero
- c) Ballottamento parti fetali
- d) Presenza del battito cardiaco fetale
- e) Tutti i precedenti

24) Secondo le linee guida NICE Antenalcare 2021 i controlli in gravidanza:

- a) Non sono differenziati fra le nullipare e le pluripare
- b) N. 10 per le nullipare e n. 7 per le pluripare
- c) N. 12 per le nullipare e n.8 per le pluripare
- d) N. 8 per le nullipare e n. 4 per le pluripare
- e) N. 9 per le nullipare e 7 per le pluripare

25) L'amniocentesi solitamente si effettua:

- a) Tra la 15° e 18° settimana di gravidanza
- b) Tra la 12° e 14° settimana di gravidanza
- c) Tra la 20° e 23° settimana di gravidanza
- d) Tra la 9° e 10° settimana di gravidanza
- e) Dopo la 25° settimana di gravidanza

26) La manovra di Rubin I:

- a) Consiste in una pressione sovrapubica applicata in combinazione con la manovra di Mc Roberts
- b) Consiste nel favorire la rotazione delle spalle del feto in posizione obliqua

- c) Consiste nel rimuovere il braccio posteriore inserendo le mani nella cavità sacrale
- d) Consiste nel riposizionamento della testa fetale in utero
- e) Consiste nell'iperflessione delle cosce materne verso l'addome

27) La denuncia di nascita secondo Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, quale affermazione è errata?

- a) Può esser resa entro 10 giorni presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto
- b) Può esser resa entro 3 giorni presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita
- c) La dichiarazione può essere ricevuta dal Direttore Sanitario se il bambino è nato morto, ovvero se è morto prima che è stata resa la dichiarazione stessa
- d) Nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre
- e) Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo

28) Quale fra le seguenti condizioni non è permittente all'applicazione del forcipe ostetrico?

- a) Dilatazione completa
- b) Vescica vuota
- c) Attività contrattile valida
- d) Presentazione di vertice
- e) Prematurità

29) Nella classificazione dei tagli cesarei secondo Robson al gruppo 6 appartengono:

- a) Tutte le donne nullipare con una gravidanza singola podalica
- b) Tutte le donne multipare con una gravidanza singola podalica incluse donne con precedenti TC
- c) Tutte le donne con gravidanze multiple incluse donne con precedenti TC
- d) Tutte le donne con una gravidanza singola con situazione trasversa o obliqua, incluse donne con precedenti TC
- e) Tutte le donne con una gravidanza cefalica singola <37 settimane di gestazione, incluse donne con precedenti TC

30) Il dosaggio del marker sierico CA 125 per quale tumore è più appropriato?

- a) Tumore della granulosa-teca dell'ovaio
- b) Cistoadenocarcinoma sieroso
- c) Tumore del seno endodermico
- d) Tumore delle cellule di Sertoli- Leydig
- e) Coriocarcinoma

TEST N. 4

- 1) Quali tra i seguenti segni/ sintomi non sono caratteristici della Tireotossicosi Gravidica?
 - a) Bradicardia, ipotermia
 - b) Tachicardia, ipertermia
 - c) Nausea, vomito, diarrea
 - d) Irrequietezza, nervosismo
 - e) Aumento valori ematici di triiodotironina e tetraiodotironina

- 2) Cos'è il fumo di terza mano?
 - a) E' quello che viene inalato involontariamente dalle persone che si trovano a contatto con uno o più fumatori "attivi"
 - b) E' quello proveniente dal fumo della sigaretta elettronica
 - c) E' rappresentato dai residui tossici rilasciati nell'ambiente da sigarette spente che si depositano su vestiti, tappezzeria, oggetti, mobili
 - d) E' quello di chi fuma dentro un'automobile
 - e) Tutte le precedenti

- 3) Nella presentazione di bregma qual è il diametro fetale che si impegna nella pelvi?
 - a) Sottomento bregmatico
 - b) Sottoccipito bregmatico
 - c) Occipito frontale
 - d) Mento occipitale
 - e) Mento bregmatico

- 4) Quanto misura la coniugata ostetrica?
 - a) Circa 9-10 cm
 - b) Circa 13 cm
 - c) Circa 10,6 cm
 - d) Circa 8 cm
 - e) Circa 14 cm

- 5) Quale tra le seguenti non è un fattore predisponente alla presentazione podalica?
 - a) Pluriparità
 - b) Gravidanza gemellare
 - c) Oligoamnios
 - d) Prematurità
 - e) Pregresso taglio cesareo

- 6) Con la terza manovra di Leopold si valuta:
 - a) Il livello raggiunto dal fondo dell'utero
 - b) Quale parte del feto si trova all'ingresso pelvico
 - c) La situazione del feto
 - d) La posizione del dorso fetale e le sue piccole parti
 - e) La discesa della parte presentata nello scavo pelvico

- 7) La Costituzione della Repubblica Italiana riconosce e garantisce la Salute come:
 - a) Diritto dei cittadini Italiani
 - b) Diritto dei cittadini Europei

- c) Diritto delle Comunità Locali
 - d) Diritto delle persone
 - e) Tutte le precedenti
- 8) Quali sono i criteri diagnostici che vanno a determinare il test qSofa (Quick Sequential Organ Failure Assessment),utile a distinguere la sepsi da infezioni non complicate?
- a) Stato mentale, pressione arteriosa, atti respiratori
 - b) Stato mentale, frequenza cardiaca, atti respiratori
 - c) Stato mentale, temperatura frequenza cardiaca
 - d) Stato mentale pressione arteriosa diuresi oraria
 - e) Stato mentale, pressione arteriosa, saturazione ossigeno
- 9) Nausea e vomito sono comuni in gravidanza a causa di:
- a) Aumentati livelli di prolattina
 - b) Ridotti livelli di progesterone
 - c) Aumentati livelli di estrogeni ed hCG
 - d) Ridotti livelli di estrogeni
 - e) Nessuna delle precedenti
- 10) Quale delle seguenti non è una indicazione assoluta al taglio cesareo?
- a) Presentazione di faccia
 - b) Prolasso del funicolo
 - c) Placenta previa centrale
 - d) Pregresso taglio cesareo
 - e) Sofferenza fetale acuta ad inizio del travaglio
- 11) Quale delle seguenti non è una complicanza del diabete gestazionale?
- a) Macrosomia fetale
 - b) Morte fetale endouterina
 - c) Placenta previa
 - d) Polidramnios
 - e) Aborto del primo trimestre
- 12) Qual è il farmaco antagonista del Solfato di Magnesio?
- a) Insulina endovenosa
 - b) Calcio Gluconato
 - c) Benzodiazepine
 - d) Ringer Lattato
 - e) Nifedipina
- 13) I segni caratteristici della HELLP syndrome sono:
- a) Emolisi, aumento dei valori degli enzimi epatici, diminuzione delle piastrine
 - b) Emolisi, aumento dei valori degli enzimi epatici e delle piastrine
 - c) Diminuzione della bilirubina e del lattato deidrogenasi
 - d) Aumento del valore dell'emoglobina e degli enzimi epatici, diminuzione delle piastrine
 - e) Nessuno dei precedenti
- 14) Il galattocele è:
- a) Dilatazione pseudocistica di un dotto della ghiandola mammaria, con conseguente raccolta di latte densificato
 - b) Processo infiammatorio su base infettiva che interessa il parenchima mammario

- c) Proliferazione papillare delle cellule epiteliali duttali
 - d) Addensamento ghiandolare a margini sfumati, di consistenza non dura
 - e) Lesione eczematosa del capezzolo
- 15) L'UNICEF e l'OMS hanno redatto un decalogo di *Passi* a sostegno dell'allattamento al seno, che ogni Struttura Sanitaria deve adottare per poter essere riconosciuta "*Ospedale amico del bambino*", quale fra i seguenti rappresenta il settimo passo?
- a) Aiutare le madri perché comincino ad allattare al seno già mezz'ora dopo il parto
 - b) Mostrare alle madri come allattare e come mantenere la secrezione lattea anche nel caso in cui vengano separate dai neonati
 - c) Informare tutte le donne in gravidanza dei vantaggi e della gestione dell'allattamento al seno
 - d) Non dare tettarelle artificiali o succhiotti ai neonati durante il periodo dell'allattamento
 - e) Sistemare il neonato nella stessa stanza della madre (rooming-in) in modo che trascorrono insieme ventiquattr'ore su ventiquattro durante la permanenza in ospedale
- 16) Quale delle seguenti non è una complicanza legata alla anomalia della presentazione cefalica?
- a) Prolasso funicolo
 - b) Travaglio prolungato
 - c) Emorragia cerebrale neonatale
 - d) Rottura vasi previ
 - e) Traumi fetale
- 17) I fattori di rischio per i traumi perineali da parto comprendono:
- a) Durata secondo stadio superiore alle due ore
 - b) Distocia di spalle
 - c) Macrosomia
 - d) Etnia materna
 - e) Tutti i precedenti
- 18) Il dosaggio ematico della Procalcitonina è indicato in caso di sospetto di:
- a) Seps/shock settico
 - b) Coagulazione intravascolare disseminata
 - c) Pre eclampsia
 - d) Edema polmonare acuto
 - e) Embolia da liquido amniotico
- 19) Il segno di Chadwick in gravidanza è:
- a) La colorazione bluastra delle mucose dei genitali esterni legata all' aumentata vascolarizzazione
 - b) La colorazione più scura dei capezzoli
 - c) La colorazione più scura che si estende dall'ombelico al tubercolo pubico
 - d) L'iperpigmentazione della faccia (naso e guance)
 - e) La presenza di striature rossastre e/o biancastre a livello dell'addome e cosce
- 20) Si definisce una gravida obesa con:
- a) BMI < 18,5
 - b) BMI 25,0- 29,9
 - c) BMI 18,5- 24,5
 - d) BMI > 30
 - e) BMI > 40
- 21) Qual è la complicanza ostetrica che può dar origine alla coagulazione intravasale disseminata?

- a) Distacco della placenta
- b) Morte fetale endouterina
- c) Sindrome HELLP
- d) Tutte le precedenti
- e) Nessuna delle precedenti

22) I dotti ostruiti possono essere causati da:

- a) Trauma del seno
- b) Poppate frequenti
- c) Rimozione del latte con spremitura manuale del seno
- d) Massaggio del seno
- e) Presenza di ragade al capezzolo

23) In che cosa consiste la manovra di Rubin II?

- a) Consiste nel favorire la rotazione delle spalle del feto in posizione obliqua inserendo le dita di una mano dietro la spalla più accessibile e spingendo la spalla verso il torace fetale
- b) Riposizionamento della testa fetale in utero e successivo parto cesareo
- c) Consiste in una pressione soprapubica applicata in combinazione con la manovra di Mc Roberts
- d) Consiste nel rimuovere il braccio posteriore
- e) Nessuna delle precedenti

24) Cosa si intende per Incident Reporting?

- a) E' una modalità di raccolta di segnalazioni in modo strutturato di eventi avversi o *near miss*, allo scopo di fornire una base di analisi, predisposizioni di strategie e azioni di correzione e miglioramento per prevenire l'accadimento in futuro
- b) E' una modalità di raccolta e di segnalazioni di eventi avversi o *near miss*, allo scopo di servire una base di analisi, predisposizioni di strategie e azioni di correzione e miglioramento allo scopo di identificare e sanzionare chi ha segnalato
- c) E' una modalità di raccolta e di segnalazioni di eventi avversi o *near miss*, allo scopo di fornire alla Direzione Aziendale una base di analisi che permetta di evidenziare eventuali criticità dei differenti contesti clinici da discutere negli obiettivi di budget
- d) E' una modalità di raccolta e di segnalazioni di eventi avversi o *near miss*, allo scopo di servire una base di analisi, predisposizioni di strategie e azioni di correzione e miglioramento senza il coinvolgimento dei professionisti interessati nell'evento
- e) Nessuna delle precedenti

25) Secondo le Linee Guida ERC 2021 nella rianimazione neonatale è raccomandato:

- a) Un rapporto compressioni/ ventilazioni 3:1
- b) Un rapporto compressioni/ ventilazioni 5:2
- c) Un rapporto compressioni/ ventilazioni 4:1
- d) Un rapporto compressioni/ ventilazioni 6:1
- e) Un rapporto compressioni/ ventilazioni 3: 2

26) Quale dei seguenti parametri non è compreso nella valutazione dell'Indice di Apgar?

- a) Colore della pelle
- b) Frequenza cardiaca
- c) Riflessi agli stimoli
- d) Tono muscolare
- e) Temperatura corporea

27) La denuncia di nascita secondo Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, quale affermazione è errata?

- a) Può esser resa entro 10 giorni presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto
- b) Può esser resa entro 3 giorni presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita
- c) La dichiarazione può essere ricevuta dal Direttore Sanitario se il bambino e' nato morto ,ovvero se e' morto prima che è stata resa la dichiarazione stessa
- d) Nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre
- e) Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo

28) Il farmaco di prima scelta nel trattamento dell'emorragia post parto è:

- a) Ossitocina
- b) Misoprostolo
- c) Acido tranexamico
- d) Metilergometrina
- e) Prostaglandine

29) Il profilo professionale della ostetrica/o è definito nel:

- a) D.M. 14.10.1994, n.740
- b) D.lg 14.09.1994, n.470
- c) D.M. 14.09.1994 ,n. 740
- d) D.lg 14.10.1994, n.740
- e) Nessuna delle precedenti

30) La legge n. 194 del 22 maggio 1978 definisce:

- a) Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza
- b) L'istituzione dei Consultori familiari
- c) Il profilo professionale dell'Ostetrica
- d) Il Codice Deontologico
- e) Gli standard assistenziali dei Punti Nascita