





Prova Pratica n. 2


Caso n. 1

- Donna di 40 anni con lesione di 17 mm del prolungamento ascellare mammario sin.
- Classificazione mammografica/ecografica: U4-U5
- Viene effettuata biopsia stereotassica mammaria







E-caderina




Recettori estrogenici




Recettori progestinici



Ki67







Her2





Caso n. 2


- Paziente di anni 49, affetto da iperplasia prostatica senza disturbi minzionali
- PSA Totale 6.35
- Agobiopsie prostatiche multiple
- *PS: viene mostrata una singola sede*








AMARC





34BE12

Caso n. 3

- Paziente di sesso maschile di anni 13, che soffre di dolori addominali dall'asilo. Di recente episodi di emocchezia.
- Endoscopia coloretale: in ampolla è presente un polipo tondeggiante iperemico con tozzo peduncolo e testa di circa 2 cm.
- Asportazione endoscopica della lesione.










Riassunto Caso n. 3


- Paziente di sesso maschile di anni 13, che soffre di dolori addominali dall'asilo. Di recente episodi di emocchezia.
- Endoscopia coloretale: In ampolla è presente un polipo tondeggiante iperemico con tozzo peduncolo e testa di circa 2 cm
- Asportazione endoscopica della lesione





Caso n. 4


- Paziente di sesso maschile di 73 anni
- Sospetto clinico riferito di lentigo solare piramide nasale








Melan A





PRAME





Caso n. 5


- Paziente di sesso maschile, 77 anni. Riferisce disfonia ingravescente da circa 6 mesi, da qualche settimana insorgenza di disfagia
- TC Collo:neoformazione a maggior asse di 16 mm circa, che origina inferiormente dalla corda vocale vera di dx. Conservate le cartilagini tiroidee. Non linfadenomegalie in ambito cervicale
- Intervento di laringectomia parziale destra laser-endoscopica (cordectomia allargata tipo V a-c-d sec. ELS)
















Caso n. 6

- Donna di 38 anni
- Massa retroperitoneale pararenale di 15 x 12 x 8 cm





Actina muscolare liscia



HMB 45

